



Post COVID-19 Immunization Symptom Screener

This tool was developed to help healthcare facilities with determining post-vaccination signs and symptoms that can be challenging to distinguish from COVID-19 or other infectious disease. In recognizing post-vaccination signs and symptoms, healthcare facilities can avoid unnecessary work restrictions that can have negative consequences for healthcare workers and patients.

STOP-Exclude

EXCLUDE from work and test for COVID-19 +/- influenza if ANY of the following (non-baseline) symptoms occur because these symptoms are NOT known immunization side effects:

- Cough
- Shortness of breath
- Runny nose
- Sore throat
- Loss of taste
- Loss of smell

CAUTION-Reevaluate


Reevaluate HCW's who feel well enough to work if any of the following for **more than 48 hours post-immunization**:

- Fever (temp greater than 100.0° F)
- Fatigue (does not need to be resolved, but requires eval if not improving)
- Headache (does not need to be resolved, but requires eval if not improving)
- Chills (does not need to be resolved, but requires eval if not improving)
- Myalgia (does not need to be resolved, but requires eval if not improving)
- Arthralgia (does not need to be resolved, but requires eval if not improving)

GO-May work

For the first 48 hours post-immunization HCW who are afebrile without reliance on antipyretic medications and feel well enough to work do not need to be excluded for the following symptoms:

- Resolved post-immunization fever
- Fatigue
- Headache
- Chills
- Myalgia
- Arthralgia



CDC Reference: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/post-vaccine-considerations-healthcare-personnel.html>





Inmunización posterior a COVID-19 evaluación de síntomas

Esta herramienta fue desarrollada para ayudar a los centros de salud a determinar los signos y síntomas posteriores a la vacunación que pueden ser difíciles de distinguir de COVID-19 u otras enfermedades infecciosas. Al reconocer los signos y síntomas posteriores a la vacunación, las instalaciones de salud pueden evitar restricciones laborales innecesarias que pueden tener consecuencias negativas para los trabajadores de salud (TDS) y los pacientes.

ALTO-Excluir

EXCLUYE del trabajo y tome la prueba para COVID-19 +/- gripe si CUALQUIERA de los siguientes (no basal) síntomas se producen porque estos síntomas NO son conocidos efectos secundarios de la inmunización:

- Tos
- Dificultad para respirar
- Rinorrea
- Dolor de garganta
- Perdida del gusto
- Perdida del olfato

CUIDADO-Reevaluar


Reevaluar TDS que se sienten lo suficientemente bien como para trabajar si alguno de los siguientes durante más de 48 horas después de la inmunización:

- Fiebre (temperature superior a 100.0° F)
- Fatiga (no es necesario resolver, pero requiere evaluación si no mejora)
- Dolor de cabeza (no es necesario resolverlo, pero requiere evaluación si no mejora)
- Enfriamientos (no es necesario resolver, pero requiere evaluación si no mejora)
- Mialgia (no es necesario resolver, pero requiere evaluación si no mejora)
- Artralgia (no es necesario resolver, pero requiere evaluación si no mejora)

SIGA-Podría trabajar

Durante las primeras 48 horas después de la inmunización TDS que están sin fiebre sin depender de medicamentos antipiréticos y se sienten lo suficientemente bien como para trabajar no es necesario excluir para los siguientes síntomas:

- Fiebre postier-inmunización resuelta
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Resfriado
- Mialgia
- Artralgia



CDC Referencia: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/post-vaccine-considerations-healthcare-personnel.html>

